

التبیهات الزراعية

2023/05/17

البوفروة على أشجار النخيل



تتواجد أشجار النخيل في المناطق الجنوبية المعروفة بزراعة النخيل المبكرة في طور " التبرعم الى تطور الثمار" طور قابل للإصابة بالبوفروة حيث ظهرت أولى البؤر في ولاية ورقلة على صنف تافزوين.

لهذا الغرض يتوجب على منتجي التمور الذين لاحظوا أولى الإصابات بالبوفروة، التدخل فورا عن طريق رش مبيدات عنكبوتية مخصصة و مرخصة

بالنسبة لمزارع النخيل الغير مصابة، يتوجب على منتجي التمور أخذ الحيطة و الحذر و ذلك من خلال مراقبة عراجين التمور، لإتخاذ التدابير اللازمة و المعالجة في حالة ظهور أولى البؤر



Oligonychus afrasiaticus

مسؤول الإعداد:

- جمالي.ف
- عبوا.

12، نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف: 023.82.88.86

الفاكس: 023.82.88.96

الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz



17/05/2023

Boufaroua sur palmier dattier

Le stade phénologique du palmier dattier s'approche du grossissement des fruits dans les régions phoénicoles précoces du Sud; stade réceptif aux attaques des acariens dont le premier foyer a été signalé dans la wilaya d'Ouargla sur la variété Tafezouine.



A cet effet, il est recommandé aux phoéniculteurs ayant observé les premières attaques du boufaroua d'entamer immédiatement les traitements par l'application d'un produit acaricide approprié.

Dans les régions non encore infestées, les phoéniculteurs doivent rester vigilants en surveillant de près les régimes de dattes afin de se préparer à une éventuelle intervention par des traitements chimiques dès l'apparition des premiers foyers.



Oligonychus afrasiaticus

Responsable de l'élaboration:
-Djemali.F
-Abbou.A

12, Avenue des Frères Ouadek Hacene Badi El Harrach Alger

Tél: 023 82 88 86

Fax: 023 82 88 96

Site web www.inpv.edu.dz