



وزارة الفلاحة و التنمية الريفية  
المعهد الوطني لحماية النباتات  
مديرية الدعم التقني



الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 34  
من 05/30 الى 2022/06/05

الرياح 	درجة الحرارة 	الطقس 	المناطق العوامل المناخية
<p>الرياح المرتقبة تكون معتدلة عموما. أحيانا قوية نسبيا وهذا على المناطق الهضاب العليا مع تطاير للرمال .</p>	<p>درجات الحرارة القصوى تكون مرتفعة حيث تتراوح بين 24°م و 32°م على مستوى المناطق الساحلية و المناطق الداخلية. ومن 32°م الى 38°م على مستوى الهضاب العليا والاوراس لتصل الى 41/39°م ابتداء من يوم الثلاثاء الى الخميس.</p>	<p>أجواء صحوة الى غائمة جزئيا بداية الأسبوع مع ارتفاع محسوس في درجة الحرارة على العموم. تشكل خلايا رعدية على مستوى المناطق الداخلية، الهضاب العليا والاوراس تؤدي إلى تساقط أمطار محلية على شكل زخات يوم الثلاثاء الى الخميس.</p>	<p>المناطق الشمالية</p>
<p>الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة. تكون قوية نسبيا وهذا على مستوى شمال الصحراء، الصحراء الوسطى الى أقصى الجنوب مع تطاير للرمال .</p>	<p>درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 35°م و 39°م على غرب وشمال الصحراء و الطاسيلي. و بين 40°م و 44°م على باقي المناطق الصحراوية الأخرى لتصل الى 46/45°م مع نهاية الاسبوع.</p>	<p>تبقى الأجواء حارة نسبيا. صحوة إلى غائمة جزئيا عموما على معظم المناطق الصحراوية. تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار محلية على شمال الصحراء الواحات.</p>	<p>المناطق الجنوبية</p>

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة الفلاحية
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ مراقبة والمعالجة عند ظهور أولى الاعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)</li> <li>♦ مراقبة العصافير الضارة على مستوى محيط حقول الحبوب. استعمال وسائل الترويع والتهديم الفوري للاعشاش النشطة (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)</li> </ul>	<p>الأمراض الفطرية (الصدأ الأصفر و الفيزاريوز) المن العصافير الضارة</p>	<p>الأمراض الفطرية (الصدأ الأصفر و الفيزاريوز) المن العصافير الضارة</p>	<p>تكون الحبات (الطور اللبني-العجيني) نهاية النضج الى بداية الحصاد</p>	<p>غرب وسط شرق جنوب</p>	<p>الحبوب</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ مراقبة والمعالجة ضد حشرة البرغوث و خنفساء الأرض على السلجم الزيتي(المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV).</li> </ul>	<p>حشرة البرغوث ألتيز سوسة ساق السلجم الحشرات الليلية</p>	<p>حشرة البرغوث ألتيز سوسة ساق السلجم الحشرات الليلية</p>	<p>تشكل الخرادل نضج الخرادل</p>	<p>غرب وسط شرق جنوب</p>	<p>السلجم الزيتي</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ احترام الإجراءات الاحترازية</li> <li>♦ مراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)</li> <li>♦ احترام الفترة ما قبل الجني</li> </ul>	<p>حفارة الطماطم اللفحة المبكرة البياض الزغبي البياض الدقيقي العفن الرمادي المن</p>	<p>حفارة الطماطم اللفحة المبكرة البياض الدقيقي البياض الزغبي العفن الرمادي المن</p>	<p>04-31 باقة زهرية 08 باقة زهرية الى الجني</p>	<p>وسط شرق غرب جنوب</p>	<p>الطماطم المحمية</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ احترام الإجراءات الاحترازية</li> <li>♦ مراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)</li> <li>♦ احترام الفترة ما قبل الجني</li> </ul>	<p>حفارة الطماطم الفراشات الليلية المن البياض الزغبي</p>	<p>البياض الزغبي حفارة الطماطم اللفحة المبكرة الفراشات الليلية المن</p>	<p>الغرس-03 باقة زهرية الجني</p>	<p>وسط شرق غرب جنوب</p>	<p>الطماطم الصناعية</p> 

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> <li>احترام الإجراءات الاحترازية</li> <li>المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض البياض الزغبي (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد (INPV)</li> </ul>	البياض الزغبي المن	البياض الزغبي البياض الدقيقي المن الفراشات الليلية	تشكل و تضخم الدرنات – نضج الدرنات ببداية الجنبي (مناطق مبكرة)	الغرب الوسط الشرق	البطاطا الموسمية 
<ul style="list-style-type: none"> <li>المراقبة والمعالجة عند ظهور اولي الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد (INPV )</li> </ul>	حفارة الأنفاق العناكب القشريات المن	حفارة الأنفاق العناكب القشريات المن	الازهار	وسط غرب شرق	الحمضيات 
<ul style="list-style-type: none"> <li>المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد (INPV )</li> </ul>	تجدد أوراق الخوخ المونيلوز المن الكورينيوم	تجدد أوراق الخوخ المونيلوز الفاثلة الشرقية الكورينيوم	تضخم الثمار الى نضج الثمار	غرب وسط شرق جنوب	أشجار الفواكه ذات النواة (اللوزيات) 
<ul style="list-style-type: none"> <li>المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد (INPV )</li> </ul>	دودة التفاح و الاجاص البيسلا البياض الدقيقي المن التبقع	التبقع اللفحة النارية البياض الدقيقي البيسلا المونيلوز دودة التفاح و الاجاص	تشكل العقد الى تضخم الثمار	غرب وسط شرق	أشجار الفواكه ذات البذور 
<ul style="list-style-type: none"> <li>المراقبة والمعالجة قبل وعند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد (INPV )</li> </ul>	البياض الزغبي المن	البياض الزغبي البياض الدقيقي العفن الاسود المن	عناقيد واضحة الى براعم زهرية متفرقة	غرب وسط شرق	الكروم 

<p>♦ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)</p>	<p>عين الطاووس حشرة الزيتون القطنية مرض سل الزيتون حشرة الزيتون القطنية</p>	<p>فراشة الزيتون حشرة الزيتون القطنية قشرية الزيتون السوداء عين الطاووس مرض سل الزيتون</p>	<p>تشكل العناقيد الى الازهار</p>	<p>غرب وسط شرق</p>	<p>الزيتون</p> 
<p>♦ مراقبة تعفن اكمام طلع النخيل (الخامج) في مناطق الإنتاج المبكرة للتمور. ♦ مراقبة و معالجة أفة البوفروة في المناطق المصابة (المناطق المبكرة).</p>	<p>تعفناكمام طلع النخيل (الخامج) البوفروة</p>	<p>تعفن اكمام طلع النخيل (الخامج) البوفروة</p>	<p>تعقد الثمار(لولو) +</p>	<p>جنوب</p>	<p>أشجار النخيل</p> 

/  
\*

+  
+--+